

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## REGION MIDI-PYRENEES

## **ÉDITION GRANDES CULTURES**

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA Tél. (61) 24 06 51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel : 80 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP : 8612-11 R Toulouse

BULLETIN Nº 14 DU 28 SEPTEMBRE 1983

COLZA /

Pour les premiers semis, la levée a débuté. Elle devrait être générale dans les tout prochains jours, malgré la sécheresse superficielle du sol.

## \* DESHERBAGE

de MIDI-PYRÉNÉES Le Directeur-Gérant J TOUZEAU C.P.P.A.P. Nº 532 AD

级心波略器 Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles

Le désherbage de pré-levée a fait l'objet d'une information dans notre bulletin n° 13 du 6 septembre 1983.

Dans le tableau ci-après, sont indiqués les herbicides conseillés en postlevée du colza. Ceux-ci sont efficaces essentiellement contre les graminées.

Certaines spécialités commerciales présentent néanmoins une action complémentaire sur dicotylédones (voir en colonne "Observations").

Tableau des herbicides conseillés en post-levée du colza

<del></del>	<del>, </del>	<del>, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	<del></del>	<del></del>
MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES	DOSE DE LA SPECIALITE à l'ha	EPOQUE D'APPLICATION	OBSERVATIONS
Alloxydime- sodium	FERVIN	0,75 kg	Utilisable à tout stade du colza, dès la levée des adventices.	L'adjonction d'huile (à 3 l/ha) est conseillée contre graminées vivaces.
Carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Utilisable jusqu'à 3 se- maines avant reprise de végétation, même sur sol gelé.
Carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza.	Action complémentaire sur quelques dicotylédanes : véroniques, mourons, coque licots.
Dalapon	nombreuses spécialités	3 <b>k</b> g	Dès le stade 2-3 feuilles du colza.	Utiliser avant la période des gelées.

(suite du tableau au verso)

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES	DOSE DE LA SPECIALITE à l'ha	EPOQUE D'APPLICATION	OBSERVATIONS
Fluazifop- butyl	FUSILADE	1 <b>,</b> 5 L	Dès le stade coty- lédonnaire du colza.	Utiliser très précocément, dès la levée des adventi- ces. L'adjonction d'huile (ACTIPLUS à 1 L/ha) est conseillée.
Propyzamide	KERB 50 W	1,5 à 3 kg (contre chiendent- agropyrum)	Dès le stade 3 feuilles du colza	Utilisable sur sol gelé.
Propyzamide + diuron	KERB-ULTRA	1,2 kg	Dès le stade 4 feuilles du colza	Action complémentaire sur quelques dicotylédones : sanves, ravenelles, stel-laires.
Sethoxydime	FERVINAL	2 <b>,</b> 5 l	Dès le stade 3 feuilles du colza	L'utilisation à 2 l/ha de FERVINAL est possible. L'adjonction d'une huile (3 l/ha) est alors con- seillée.

\*

.

•